

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. - CCP OJON 35 00 28 0



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 25 - 19 octobre 1988

CEREALES D'HIVER : Apparition des premiers pucerons

COLZA

Charançon du bourgeon terminal : Traitement souvent justifié

CEREALES D'HIVER

Beaucoup de semis ont été mis en place depuis une semaine.

Les quelques parcelles semées fin septembre atteignent la 3ème feuille. Les semis des premiers jours d'octobre sont à 1-2 feuilles.

PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE

SITUATION :

Les premiers pucerons sont parfois visibles sur les cultures. Les formes ailées sont les plus fréquentes et peu de jeunes colonies sont présentes.

Dans les parcelles concernées, on observe rarement plus de 4 à 5 % de pieds porteurs de pucerons, sauf dans le Sud de la Saône-et-Loire où certaines parcelles présentent jusqu'à 12-15 % de pieds porteurs de pucerons.

PRECONISATION :

Surveiller l'évolution des pucerons dans les parcelles, en particulier pour les situations les plus avancées ; (l'observation des pucerons est plus facile par beau temps).

Dans l'ensemble, aucune intervention n'est encore à envisager, sauf situation très ponctuelle où des populations en croissance touchent plus de 10 % des plantes. Dans de telles situations, éviter cependant les traitements trop hâtifs, qui pourraient nécessiter un renouvellement.

PYRALE DU MAIS

Le broyage et l'enfouissement soignés des résidus de récolte constituent un moyen efficace de réduire les populations de pyrale pour la prochaine campagne. En zones de population moyenne, la généralisation de cette mesure peut limiter considérablement les risques en cas de non traitement.

COLZA

Les stades sont toujours très hétérogènes. Ils s'échelonnent du stade cotylédon au stade 6-7 feuilles.

P. 89

CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

GENERALITE :

La décision de traitement se raisonne en fonction :

- des dates de premières captures en cuvettes jaunes : traitement 10 à 15 jours après le début des vols.
- du stade du colza :
 - . les cultures n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles vraies ne sont pas réceptives aux pontes,
 - . sur des colzas insuffisamment développés, reporter le traitement à une date ultérieure. Il deviendra inutile si une période de gelées marquée intervient d'ici là .
- Du nombre de captures. Une absence de piégeage entraîne un risque nul. Cependant il n'existe pas de relation entre le nombre de captures en cuvettes jaunes et les dégâts observés. Un vol intense peut entraîner une absence totale de dégât (un gel précoce empêche les pontes, une reprise rapide de la végétation au printemps limite les dégâts..) alors qu'un vol en apparence faible (1 ou 2 charançons) peut provoquer une forte attaque (un automne doux favorise les pontes, un hiver prolongé permet une plus grande destruction des bourgeons terminaux...)

SITUATION :

Les captures continuent. Elles ont été notamment précoces dans l'Yonne et le Nord de la Côte-d'Or. Dans les autres zones, de nombreux postes signalent leur première capture cette semaine.

PRECONISATION :

Un traitement est à envisager dès maintenant dans les zones où les captures ont été enregistrées début octobre (Yonne, Nord Côte-d'Or) ailleurs il n'est pas encore utile de traiter dans l'immédiat.

GROSSES ALTISES

SITUATION :

Le vol d'altises continue mais reste faible sauf très localement.

PRECONISATION : Ne pas intervenir.

*

*

*